

腋臭症手術同意書

蔵 皮フ科・形成外科
院長 松川 中

1. 当院では、剪除法（せんじょほう）と超音波破壊吸引法を組み合わせた術式を行っています。
2. 臭いの原因であるアポクリン汗腺を除去するとともに、多汗の原因であるエクリン汗腺も一部除去します。
3. 臭いの消失率は、80～90%です。
4. 麻酔は細い針で行います。
5. 腋（わき）に1cmほどの切開を、3～8か所いれます。
6. ガーゼを皮膚に縫い付けて止血しますので、2～4日後にガーゼを除去するため来院していただくことになります。
7. 本来は入院して行う手術ですので、手術後7日間は局所をなるべく動かさないよう安静にしてください。動かし過ぎると静脈内の血液が凝固して索状のしこりを残すことがあり、血腫ができて皮膚潰瘍になることがあります。
8. 術後に内出血で腕や胸に紫色のあざが出来ますが、ほとんどは自然に消えます。
9. 術後に色素沈着を残すことがありますが、漸次薄れてきます。
10. 術後の腋毛の状態は個々によって差異があります。
11. 未成年の場合は再発することがあります。
12. 降圧薬や抗凝固薬などを服用していると出血が多くなりますので、担当医とご相談のうえ手術の1週間前より中断してください。

以上の注意事項を十分に理解し、納得した上で治療を受けることに同意します。

キリトリ

年 月 日

カルテNo.

氏名

腋臭症